

6 Besprechung in Mathematik für Physiker II zum Blatt 6, zum 28.5.2010


6.1

a) Zeige: $\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(y)dy \geq a \cdot b$

Wenn $f(a) = b$, dann gilt $\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(y)dy = a \cdot b$

Wenn $f(a) > b$, dann gilt $\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(y)dy > a \cdot b$

Wenn $f(a) < b$, dann gilt $\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(y)dy < a \cdot b$



b) Mit Young und $f(x) = x^{p-1} = y$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = y^{\frac{1}{p-1}} = \sqrt[p-1]{y}$$

$$\text{Nach Young gilt: } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow \frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} \Rightarrow q = \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = \frac{1}{\frac{p-1}{p}} = \frac{p}{p-1} = \frac{p+1-1}{p-1} =$$

$$\frac{p-1}{p-1} + \frac{1}{p-1} = 1 + \frac{1}{p-1} \Rightarrow q-1 = \frac{1}{p-1}$$

Substitution bei y: $f^{-1}(y) = y^{q-1}$

$$\text{Nach a) gilt dann } a \cdot b \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(y)dy = \int_0^a x^{p-1}dx + \int_0^b y^{q-1}dy = [\frac{1}{p-1+1}x^{p-1+1}]_0^a + [\frac{1}{q-1+1}y^{q+1-1}]_0^b = [\frac{x^p}{p}]_0^a + [\frac{y^q}{q}]_0^b = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$


6.2

$(x, y) :$

$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \cos(\varphi)$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \sin(\varphi)$$

$$(x, y, z) \in \text{Zylinder mit: } \kappa(r, \varphi, z) = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$



a) Zeige $\kappa|_{(0,\infty) \times [0,2\pi) \times \mathbb{R}}$ ist stetig und bijektiv.

κ stetig, da alle Komponenten mittels Multiplikation aus stetigen Funktionen auch stetig sind.

(cos, sin, v, z, stetig als Funktion)

1) $\kappa|_B$ injektiv, weil für $r > 0$ und für $\varphi_1, \varphi_2 \in [0, 2\pi), \varphi_1 \neq \varphi_2$ ($r \cos(\varphi_1), \sin(\varphi_1), z \neq r \cos(\varphi_2), \sin(\varphi_2), z$)
 $\kappa(r, \varphi_1, z) \neq \kappa(r, \varphi_2, z)$

2) $\kappa|_B$ surjektiv, weil für $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ genau ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ ex. mit $\frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = (\cos(\varphi), \sin(\varphi))$

$$\Rightarrow (x, y) = r(\cos(\varphi), \sin(\varphi)) = \kappa(r, \varphi)$$

$$\text{Setze: } r := \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \kappa(r, \varphi, z) = (x, y, z)$$

Da κ stet und bij. existiert eine Inverse $\kappa^{-1}(1, \frac{1}{n}, 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (1, 0, 0)$

$$\kappa^{-1}(1, [2\pi] - \frac{1}{n}, 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (1, 2\pi, 0)$$

wobei $2\pi - \frac{1}{n} \rightarrow 2\pi$

obwohl $(1, \frac{1}{n}, 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (1, 0, 0)$


und $(1, -\frac{1}{n}, 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (1, 0, 0)$ (alles im Bild von κ)

Da $\phi \in [0, 2\pi)$ ist also κ nicht stetig.

b) $\frac{\partial}{\partial r} \kappa(r, \varphi, z) = (\cos(\varphi), \sin(\varphi), 0)$

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \kappa(r, \varphi, z) = (-r \sin(\varphi), r \cos(\varphi), 0)$$


$$\frac{\partial}{\partial z} \kappa(r, \varphi, z) = (0, 0, 1)$$



6.3

$$\kappa(r, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in Kugel = \begin{pmatrix} r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$\kappa|_{(0,r] \times [0,2\pi) \times (0,\pi)}$ ist injektiv. $(0, 0, 0)$ ist Zentrum.



6.4

6.5

Zeige: $\|A\|_{\mathbb{R}^{m \times n}} := \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \underbrace{\|Ax\|}_{m \times n \cdot n \times 1 = m \times 1}$

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Betrachte: $\|A + B\| = \sup \|(A + B)x\| \leq \sup(\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \sup(\|Ax\|) + \sup(\|Bx\|) = \|A\| + \|B\|$

Weiterhin falls $\|A\| = 0 \Rightarrow A = 0$ klar.

$$\|\lambda A\| = \sup(\|(\lambda A)x\|) = |\lambda| \sup(\|Ax\|) = |\lambda| \cdot \|A\| \Rightarrow \text{Norm}$$

Für $x \neq 0$: $\|Ax\| = \|A \frac{x}{\|x\|}\| \cdot \|x\| \leq \sup_{\substack{x_0 \in \mathbb{R}^n \\ \|x_0\| \leq 1}} (\|A \cdot x_0\|) \cdot \|x\| = \|A\| \cdot \|x\|$

mit $x_0 = \frac{x}{\|x\|} \Rightarrow \|x_0\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\|$

6.6