

11 Besprechung in Analysis 2 zum Blatt 11, zum 7.7.2010

11.1

- a) Sei $\varepsilon > 0$. Es ex $\delta > 0$ mit $\forall x, y \in [a, b] \forall \lambda, \mu \in [c, d]$, $|x - y| < \delta$, $|\lambda - \mu| < \delta$:
 $|f(x, \lambda) - f(y, \mu)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

(f glm st auf der kp. Mene $[a, b] \times [c, d]$)

Speziell $|f(x, \lambda) - f(x, \mu)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ für alle $x \in [a, b]$, falls $|\lambda - \mu| < \delta$

$$\text{Für solche } \lambda, \mu : |j(\lambda) - j(\mu)| = \left| \int_a^b (f(x, \lambda) - f(x, \mu)) dx \right| \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon$$

- b) Existiere jetzt $\partial_2 f$ und sei stetig. Sei $\lambda_0 \in [c, d]$. Für $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $\lambda_0 + h \in [c, d]$ ist
 $\frac{j(\lambda_0+h)-j(\lambda_0)}{h} = \int_a^b \frac{f(x, \lambda_0+h) - f(x, \lambda_0)}{h} dx = \int_a^b \partial_2 f(x, \lambda_0 + \xi(x, h)) dx$ mit einem $\xi = xi(x, h)$
zwischen 0 und h. Da $\partial_2 f$ st. (glm. st.) ex. $\delta > 0$ mit $\forall |\partial f(x, \lambda) - \partial f(x, \mu)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$ falls
 $|\lambda - \mu| < \delta$

$$\text{Falls } |h| < \delta, \text{ so ist also } \left| \int_a^b \partial_2 f(x, \lambda_0 + \xi(x, h)) dx - \int_a^b \partial_2 f(x, \lambda_0) dx \right| \leq \int_a^b |\partial_2 f(x, \lambda_0 + \underbrace{\dots}_{||\leq \delta}) - \partial_2 f(x, \lambda_0)| dx$$

ε

Also; j diffbar bei b, $j'(\lambda_0) = \int_a^b \partial_2 f(x, \lambda_0) dx$. Nach a): j' stetig.

11.2

$$j(t) := \int_c^d \left(\int_a^t f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b g(y, t) dy$$

$=: g(x, t)$

$\partial_2 g$ ex, $d_2 g(y, t) = f(t, y)$, g ist stetig!

$$j'(t) = \int_c^d \partial_2 g(y, t) dy = \int_c^d f(t, y) dy$$

$$j(a) = 0, j(b) = \int_a^b j'(t) dt = \int_a^b \left(\int_c^t f(s, y) ds \right) dy$$

11.3

$$A(0)v_0 = \lambda_0 v_0$$

$$F(-r, r) \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

$$(t, x, \mu_0) \mapsto \begin{pmatrix} A(t) - mx \\ \|x\|_2^2 - 1 \end{pmatrix}$$

$$F(0, v_0, \lambda_0) = 0, \quad (D_{x, \mu} F)(0, v_0, \lambda_0) = \begin{pmatrix} A(0) - \lambda_0 I_0 & -v_0 \\ 2v_0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1 \times n+1} =: M$$

Fall für $\dim U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$ gilt $M_u = 0$, so das $(A(0) - \lambda_0 I) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} - u_{n+1} \cdot \vec{v}_0$ und

$$< \vec{v}_0, \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \geq 0$$

Es folgt $(A(b) - \lambda_0 I)^2 \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{u_n} \end{pmatrix} = 0$
da λ_0 alg. einfach folgt: $(A(0) - \lambda_0 I) \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ und $\exists r \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = n\vec{v}_0$ mit 2): $n = 0$, $\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = 0$, mit 1): $u_{n+1} = 0 \Rightarrow u = 0$
Folgt: $(D_{x,\mu} F)(0, v_0, \lambda_0)$ Isom. von \mathbb{R}^{n+1} . Beh. folgt aus Satz über impl. Fu'.

11.4

$A(0) \text{ symm. } A(t)v(t) = \lambda(t)v(t)$
 $\dot{A}(t)v(t) + A(t)\dot{v}(t) = \dot{\lambda}(t)v(t) + \lambda(t)\dot{v}(t)$
 $1 = \langle v(t), v(t) \rangle \Rightarrow \dot{v}(t)v(t) = 0$
Speziell bei $t=0$: $\underbrace{\langle \dot{A}(0)v_0, v_0 \rangle}_{=\langle v_0, \dot{A}(0)v_0 \rangle} + \underbrace{\langle A(0)\dot{v}(0), v(0) \rangle}_{\langle \dot{v}(0), A(0)v_0 \rangle} = \dot{\lambda}(0) \langle v_0, v_0 \rangle + \lambda(0) \langle \dot{v}(0), v_0 \rangle$
also $\dot{\lambda}(0) = \langle v_0, \dot{A}(0)v_0 \rangle$

11.5

$$q_A(x) = \langle x, Ax \rangle = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = \sum_{k=1}^n a_{kk} x_k^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i x_j$$

$$\partial_l q_A(x) = 2a_{ll}x_l + \underbrace{\sum_{i,i \neq l} a_{il} x_i}_{=..} + \underbrace{\sum_{j,j \neq l} a_{lj}}_{..=wegen a_{jl}=a_{lj}} x_j = (2Ax)_l$$

$\nabla q_A(x) = 2Ax$
„ \Rightarrow “: Sei $Av = \lambda v$ v. Z.z.: $\nabla q_A(v) \perp T_v S^{n-1}$
Also $\nabla q_A(v) = \nu v$ mit einem $r \in \mathbb{R}$ (da $(T_v S^{n-1})^\perp = \mathbb{R}v$)
Das ist richtig, da $\nabla q_A(v) = 2Av = 2\lambda v$
„ \Leftarrow “: v krit Pkt. $\Rightarrow \exists r : \nabla q_A(v) = rv \Rightarrow 2Av = rv \Rightarrow Av = \frac{r}{2}v$

11.6 Hinweise Blatt 12

- 1) Eventuell Maphy-Ende. Hinweis folgen, dann leicht. Cramische Matrix, g_{ij} etc.
- 2) a) Integral der Funktion 1 über Kugelkoordinaten (Funktionaldeterminante!)
b) eine Art Blumenvase als Körper, Volumen geht, dichte etwas krankhaft (links-rechts...).
Zylinderkoordinaten. SP vermutlich rechtslastig.
- 3) rotierende Parabel (Paraboloid), Oberfläche ohne Deckel (Kreisscheibe bei $r=1$)! Hinweis beachten. Funktion 1 integrieren.
- 4) selbe Oberfläche wie aufgebogener Torus/Zylinder.
Übliche Vorgehensweise mit $f(x)=1$
- 5) Aus Physik bekannt.
 - a) Definition einsetzen
 - b) klar, aus Physik bekannt. Wenn Gradientenfeld, Integranten $\vec{v} = \nabla U : \langle v(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle = \frac{d}{dt}(U(\gamma(t)))$, also Kurvenintegral gleich.