

9 Übungsblatt von Analysis 4 zum Mittwoch, den 8.6.2011

Aufgabe 1

a) $\psi(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2r}} \mathbb{1}_{[-r,r]}(k) e^{ikx} dk = \begin{cases} \sqrt{2r} \frac{\sin(rx)}{rx}, & x \neq 0 \\ \sqrt{2r}, & x = 0 \end{cases}$


b) Zu prüfen: $\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx < \infty$.

d.h. $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R |\psi(x)|^2 dx < \infty$

$$\left(\frac{\sin(rx)}{rx}\right)^2 \leq \underbrace{\mathbb{1}_{[-R,R]}(x)\sqrt{2r}}_{(x \mapsto [-R,R]) \in \mathbb{L}^1} + \underbrace{\frac{1}{r^2 x^2}}_{(x \mapsto \mathbb{R} \setminus [-R,R]) \in \mathbb{L}^1}$$

$$\Rightarrow (x \mapsto \left(\frac{\sin(rx)}{rx}\right)^2) \in \mathbb{L}^1$$

c) $\Delta k = r \Rightarrow \Delta k \Delta x = r \frac{\pi}{r} = \pi$



Aufgabe 2


$$f = \mathbb{1}_{[-1,1]}, \quad \hat{f}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}} (\hat{f}(x))^2 dx \stackrel{\text{Satz 8.3b)}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}} (\widehat{f * f})(x) dx$$

$$(f * f)(x) := \begin{cases} 2-x, & x \in [0, 2] \\ 2+x, & x \in [-2, 0] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(x) dx = \frac{\pi}{2} (\hat{g})^{\vee}(0)$$

$$= \frac{\pi}{2} g(0) = 2 \frac{\pi}{2} = \pi$$



Aufgabe 3

Beh.: $\hat{\mathbb{F}}\psi = \mathbb{F}\hat{H}\psi \forall \psi \in S$

$$\hat{\mathbb{F}}\psi = -\frac{1}{2} \hat{\psi}''(x) + \frac{1}{2} x^2 \hat{\psi}(x)$$

$$\hat{\psi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi(k) e^{-ikx} dk \stackrel{\psi(R) \rightarrow 0}{\underset{|R| \rightarrow \infty}{\longrightarrow}} -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi'(x) (-\frac{1}{ix}) e^{-ikx} dk$$

$$\stackrel{\psi'(x) \rightarrow 0}{\underset{|x| \rightarrow \infty}{\longrightarrow}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} p s i''(k) (-\frac{1}{ix})^2 e^{-ikx} dk$$

$$\Rightarrow -x^2 \hat{\psi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi''(k) e^{-ikx} dk = (\widehat{\psi''(x)})(x)$$

$$\hat{H}\mathbb{F}\psi(x) = -\frac{1}{2} \hat{\psi}''(x) + \underbrace{\frac{1}{2} x^2 \hat{\psi}(x)}_{-(\widehat{\psi''}(x))} = -\frac{1}{2} (\hat{\psi}''(x) - (\widehat{\psi''})(x))$$

$$\mathbb{F}\hat{H}\psi(x) = \mathbb{F}(-\frac{1}{2} \psi''(x) + \frac{1}{2} x^2 \psi(x)) = -\frac{1}{2} (\widehat{\psi''})(x) + \frac{1}{2} (\widehat{x^2 \psi})(x)$$

$$(\widehat{x^2 \psi})(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} k^2 \psi(k) e^{-ikx} dk$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (2k\psi(x) + k^2 \psi'(x)) \frac{e^{-ikx}}{(-ix)} dx$$

$$\begin{aligned}\hbar\hat{\psi}'(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi(k)(-ix)e^{-ikx}dk \\ \hat{\psi}''(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi(k)(-ix)^2 e^{-ikx}dk \\ &= -x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \psi(k)e^{-ikx}dx = -x^2\hat{\psi}(x)\end{aligned}$$

Rest nachgeliefert!

Aufgabe 4

$$\begin{aligned}c) \quad &\forall n \in \mathbb{N}: H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \Rightarrow (a), (b) \\ &\Rightarrow H_n''(x) = 2H_n(x) + 2xH_n'(x) - H_{n+1}'(x) \\ &= 2H_n(x) + 2x(2xH_n(x) - H_{n+1}(x)) - 2xH_{n+1}(x) + H_{n+2}(x) \\ &= (2+4x^2)H_n(x) - 4xH_{n+1}(x) + H_{n+2}(x) \\ &h_n'(x) = (-x)e^{-\frac{x^2}{2}}H_n(x) + e^{-\frac{x^2}{2}} = (-x)h_n(x) + e^{-\frac{x^2}{2}}H_n'(x) \\ &h_n''(x) = -h_n(x) + (-x)h_n'(x) + (-x)e^{-\frac{x^2}{2}}H_n'(x) + e^{-\frac{x^2}{2}}H_n''(x) \\ &= -h_n(x) + (-x)^2h_n(x) + 2(-x)e^{-\frac{x^2}{2}}H_n'(x) + e^{-\frac{x^2}{2}}H_n''(x) \\ &= -h_n(x) + x^2h_n(x) - 2xe^{-\frac{x^2}{2}}(2xH_n(x) - H_{n+1}(x)) + e^{-\frac{x^2}{2}}((2+4x^2)H_n(x) - 4xH_{n+1}(x) + H_{n+2}(x)) \\ &= -h_n(x) + x^2h_n(x) - 4x^2h_n(x) + 2xh_{n+1}(x) + 2h_n(x) + 4x^2h_n(x) - 2xh_{n+1}(x) + h_{n+2}(x) \\ &= (1+x^2)h_n(x) - 2xh_{n+1}(x) + h_{n+2}(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d) \quad &\hat{H}h_n(x) = -\frac{1}{2}h_n''(x) + \frac{1}{2}x^2h_n(x) = -\frac{1}{2}((1+x^2)h_n(x)9 - 2xh_{n+1}(x) + h_{n+2}(x)) + \frac{1}{2}x^2h_n(x) \\ &- \frac{1}{2}(h_n(x) - 2xh_{n+1}(x) + \underbrace{h_{n+2}(x)}_{2xh_{n+1}(x)-2(n+1)h_n(x)}) \\ &= -\frac{1}{2}(h_n(x) - 2(n+1)h_n(x)) = \frac{2n+1}{2}h_n(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e) \quad &<\hat{H}h_n, h_m>_{L^2} = < h_n, \hat{H}h_m>_{L^2} \\ &<\hat{H}h_n, h_m>_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} (\hat{H}h_n)h_m dx = \int_{\mathbb{R}} (-\frac{1}{2}h_n''(x) + \frac{1}{2}h_n(x))h_m dx \\ &(|x| \rightarrow \infty, h_m \rightarrow 0, h_n' \rightarrow 0) \\ &= \int_{\mathbb{R}} (-\frac{1}{2}h_n(x)h_m''(x) + \frac{1}{2}h_n(x)h_m(x))dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} h_n(x)(\hat{H}h_m(x))dx = < h_n, \hat{H}h_m>_{L^2} \\ &\frac{2n+1}{2} < h_n, h_m>_{L^2} = < \hat{H}h_n, h_m>_{L^2} = < h_n, \hat{H}h_m>_{L^2} \frac{2m+1}{2} < h_n, h_m>_{L^2}\end{aligned}$$

$$m \neq m \Rightarrow < h_n, h_m>_{L^2} = 0$$

Aufgabe 5

$$\begin{aligned}a) \quad &k_{\varepsilon}(\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + (\omega - \omega_0)^2} \\ b) \quad &f \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}), |k_{\varepsilon}(\omega)| \leq \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon} \\ &|fk_{\varepsilon}| \leq \frac{1}{\varepsilon} f \in \mathbb{L}^1 \\ &f \cdot k_{\varepsilon} \text{ mbar} \Rightarrow fk_{\varepsilon} \in \mathbb{L}^1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}} f k_\varepsilon d\omega = \int_{\mathbb{R}} f d\alpha_\varepsilon(\omega)$$

$$\alpha_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega - \omega_0}{\varepsilon}\right) \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} \begin{cases} 0 & , \omega = \omega_0 \\ \frac{1}{2} & , \omega > \omega_0 \\ -\frac{1}{2} & , \omega < \omega_0 \end{cases}$$

- c) Sei $\rho > 0$. $\exists \delta_1 > 0$ mit $|f(\omega) - f(\omega_0)| < \frac{\rho}{2} \quad \forall \omega \in [\omega_0 - \delta_1, \omega_0 + \delta_1]$
 $\exists \varepsilon_0 > 0$ mit $\forall \varepsilon < \varepsilon_0 : |\frac{1}{\pi} \arctan(\frac{\omega}{\varepsilon}) - \frac{1}{2}| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}, |\omega| \geq \delta_1$
Dann ist $(t_i)_I$ eine Zerlegung von \mathbb{R} . o.E. $t_i \neq \omega_0 \forall i \in I$ mit Feinheit kleiner als $\frac{\delta_1}{2}$

Sei $j \in I$ mit $t_{j-1} < \omega_0 < t_j$

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i \in I} f(\xi_i)(\alpha(t_i)\alpha(t_j)) - f(\omega_0) \right| \xrightarrow[\text{Feinheit} \rightarrow 0]{} I_\varepsilon \begin{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(\omega_0) \\ \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} f(\omega_0) \end{cases} \\ & \leq \sum_{i \in I} |f(\xi_i)(\alpha(t_i) - \alpha(t_j)) - f(\omega_0)| + 2\frac{\rho}{2} \\ & (|\frac{t_i - \omega_0}{\varepsilon}| \leq \delta_1) \\ & \leq \sum_{i \in I} |f(\xi_i) - f(\omega_0)|(\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})) \leq \sup_{i \in I} |f(\xi_i) - f(\omega_0)| \sum(\dots) + \rho \\ & \leq \frac{\rho}{2} 2\delta_1 + \rho = (\delta_1 + 1)\rho \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{} 0 \text{ (unabgh. Zerlegung)} \\ & \Rightarrow |I_\varepsilon - f(\omega_0)| \leq (\delta_1 + 1)\rho \quad \forall \varepsilon < \varepsilon_0 \end{aligned}$$