

## 2 Besprechung in Mathematik für Physiker II zum Blatt 2, zum 28.4.2010


### 2.1

(Wie in R):  $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$   
 $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \left. \begin{array}{l} \\ \text{auch } \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\| \end{array} \right\}$   
 $\Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ , Einsetzen  $-y$  statt  $y$  liefert ... + ...

### 2.2

a)  $\|f\|_1 \geq 0$  trivial.  $\|\lambda f\|_1 = \int_a^b |\lambda f(x)| dx = |\lambda| \int_a^b |f(x)| dx = |\lambda| \|f\|_1$

$$\|f + g\|_1 = \int_a^b \underbrace{|f(x) + g(x)|}_{\leq |f(x)| + |g(x)|} dx \leq \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx = \|f\|_1 + \|g\|_1$$
 $\Rightarrow \|\cdot\|_1 \text{ Seminorm}$   
 Keine Norm, z.B.  $a = 0, b = 1, f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(0) := 1, f(x) := 0$  für  $x \in (0, 1], \|f\|_1 = 0, f \neq 0$



a) Einschr. auf  $C^0([a, b], \mathbb{R})$  ist Norm.

Z.z. Falls  $f$  ste.  $\int_a^b |f| = 0, \text{ so } f = 0$

Beweis:

Zeig:  $f$  ste,  $f \neq 0 \rightarrow \int_a^b |f(x)| dx > 0$

Sei  $f$  ste.,  $f \neq 0$ . Dann ex.  $x_0 \in (a, b], |f(x_0)| > 0$

Es ex.  $\delta > 0$  mit  $\underbrace{[x_0 - \delta; x_0]}_{=: I} \subset [a, b]$  oder  $[x_0; x_0 + \delta] \subset [a, b]$

und:  $\forall x \in I : |f(x)| \geq \frac{|f(x_0)|}{2}$  (Stetigkeit von  $x \mapsto |f(x)|$  bei  $x_0$ )

Somit  $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx \geq \int_a^b \underbrace{|f(x)|}_{\geq |f(x_0)|/2} dx \geq \frac{|f(x_0)|}{2} \delta \geq 0$

### 2.3


$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1, c_1 := 1.$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| * 1 = < (|x_1|, \dots, |x_n|), (1, \dots, 1) > \leq \|x\|_2 \cdot \|(1, \dots, 1)\|_2 = \sqrt{n} \|x\|_2 \text{ (Cauchy Schwarz)}$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \underbrace{|x_i|^2}_{\leq \|x\|_\infty}} = \sqrt{n} \|x\|_\infty \sqrt{n} \|x\|_0$$

### 2.4

a)  $\tilde{K} = \{(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{R}^3 \mid x_0^2 \geq x_1^2 + x_2^2\}$



b)  $M := \{(x_0, x_1, x_2, x_3) \in K \mid -1 \leq x_0 \leq 1\}$

$M$  ist abg: Sei  $((x_0^{(n)}, \dots, x_3^{(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$  Folge in  $M$  die gegen  $(x_0^*, x_1^*, \dots, x_3^*)$  konv., dann:

$$\forall u \in \mathbb{N} : (x_0^{(n)})^2 \geq (x_1^{(n)})^2 + \dots + (x_3^{(n)})^2$$

$$-1 \leq x_0^{(n)} \leq 1$$

$$\text{Folgt: } (x_0^*)^2 \geq (x_1^*)^2 + \dots + (x_3^*)^2$$

$-1 \leq x_0^* \leq 1$ , also auch  $(x_0^*, \dots, x_3^*) \in M$   
 Also nach A5:  $M$  abg.,  $\overline{M} = \overline{\overline{M}}$   
 $\mathring{M} = \{(x_0, \dots, x_3) | x_0^2 > x_1^2 + \dots + x_3^2, -1 < x_0 < 1\}$   
 Beweis:

„ $\subset$ “: Sei  $(x_0, \dots, x_3) \in \mathring{M}$ , dann  $x \in M$ , also  $x_0^2 \geq x_1^2 + \dots + x_3^2, -1 \leq x_0 \leq 1$ .

Es ex.  $\delta > 0$  mit  $\underbrace{B_{\|\cdot\|_\infty}(x; \delta)}_{(x_0-\delta; x_0+\delta) \times (x_1-\delta; x_1+\delta) \times \dots \times (x_3-\delta; x_3+\delta)} \subset M$

Folgt:  $x_0 \notin \{\pm 1\}$  (Sonst z.B.  $(1 + \frac{\delta}{2}, x_1, x_2, x_3) \in B_{\|\cdot\|_\infty}(x_0; \delta) \subset M, x_0^2 > x_1^2 + \dots + x_3^2$  Widerspruch)

(Sonst falls  $x_0^2 = x_1^2 + \dots + x_3^2$  Widerpruch) „ $\supset$ “: Sei  $(x_0, \dots, x_3) = x \in$  rechte Seite.

Es ex.  $\delta > 0$ , so dass für alle  $\tilde{x} = (\tilde{x}_0, \dots, \tilde{x}_3) \in B_{\|\cdot\|_\infty}(x_0; \delta)$  gilt:

$\tilde{x}_0^2 > \tilde{x}_1^2 + \dots + \tilde{x}_3^2, -1 < \tilde{x}_0 < 1$ .

Somit  $B_{\|\cdot\|_\infty} \subset M$

$\partial M = \overline{M} \setminus \mathring{M} = \{(x_0, \dots, x_3) \in \mathbb{R}^4 | x_0^2 \geq x_1^2 + \dots + x_3^2, -1 \leq x_0 \leq 1 \text{ und } \text{„}=\text{“ bei einer der drei Ungleichungen}\}$

## 2.5

a) Sei  $y \in B(x, r), \rho - \|x - y\| > 0, B(y; \rho) \subset B(x; r)$

Beweis: Für  $z \in B(y; \rho); \|z - y + y - x\| \leq \underbrace{\|z - y\|}_{r - \|y - x\|} + \|y - x\| < r$ , also  $z \in B(x; r)$ .

b)  $\overline{M} := \{x \in \mathbb{R}^n | \forall \delta > 0 \exists y \in M \cap B(x; \delta)\}$

$\underbrace{\mathbb{R}^n \setminus \overline{M}}_{\text{ist offen}} = \{x \in \mathbb{R}^n | \exists \delta_0 > 0 : B(x; \delta_0) \cap M = \emptyset\}$

Beweis:  $x \in \dots, \delta_0$  wie oben, so  $B(x; \delta_0) \cap M = \emptyset$ .

Nach a):  $\forall y \in B(x; \delta_0) \exists r > 0 : B(y; r) \subset B(x; \delta_0)$ .

Also  $M \cap B(y, r) = \emptyset$ . Somit  $B(x; \delta_0) \subset \mathbb{R}^n \setminus \overline{M}$ . Also  $\overline{M}$  abg.



c) (i)  $\Rightarrow$  (ii) Sei  $M$  abg.

Beh:  $M = \overline{M}$

Bew: „ $\subset$ “ klar.

„ $\supset$ “: Sei  $x \in \overline{M}$ .  $M$  ist abgeschlossen, also  $\mathbb{R}^n \setminus M$  offen.

Wäre  $x \notin M$ , so würde  $\delta > 0$  ex. mit  $B(x; \delta) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (iii): Sei  $M = \overline{M}, (x_j) \subset M, \|x_j - x\| \rightarrow 0$ .

Beh:  $x \in \overline{M}$

Bew: Sei  $\delta > 0$ . Es ex.  $J \in \mathbb{N}$  mit  $\forall j \geq J : \|x_j - x\| < \delta$ . Dann  $x_J \in M \cap B(x; \delta)$ .

Also  $x \in \overline{M}$ . Wegen  $\overline{M} = M$  folgt: Auch  $x \in M$ .

(iii)  $\Rightarrow$  (i): Sei  $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$ .

Annahme: es existiert kein  $\delta > 0$  mit  $B(x; \delta) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$ .

Dann Existiert zu  $\delta_j := \frac{1}{j}$  ein  $x_j \in M, \|x_j - x\| < \frac{1}{j}$ .

Also  $\|x_j - x\| \rightarrow 0$ .

Nach (iii) dann  $x \in M$ , Widerspruch!.

Also ex.  $\delta > 0, B(x; \delta) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$ , also  $\mathbb{R}^n \setminus M$  offen,  $M$  abg.

d)  $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$

nach b)  $\overline{M}$  abg.

nach c) (ii):  $\overline{M} = \overline{\overline{M}}$

## 2.6 Hinweise zum nächsten Blatt

3&5 trivial.

1&2 schwer, aber in den meisten Büchern enthalten.

4 Taschenrechner benutzen!

6 nicht Trivial: B-Kugel in Norm  $p < 1$  (natürlich keine richtige Norm). Versuche zu belegen, dass Dreiecksungleichung verletzt wird. Zwischen zwei Punkten (z.b.  $(1, 0)$  und  $(0, 1)$ ) Mitte betrachten und sehen, dass die Norm nicht kleiner 1 wird, wenn Sie das soll...